



EPA-instruktion: Orkidektomi

Denna instruktion är till för att underlätta bedömningen av ST-läkaren när hen utför en radikal orkidektomi. Varje moment behöver utföras med hänsyn till god hygien och ST-läkaren skall kunna redogöra för sina val av teknik, materiel och bedövning.

Om ingreppet utförs på en vaken patient bör särskild vikt läggas vid god kommunikation och respekt för patientens integritet.

Preoperativt

- Informera patienten. Uppta relevant anamnes eller se till att den finns dokumenterad i journalen. Förklara ingreppets syfte, genomförande, risker, komplikationer, förväntat utfall och förväntat postoperativt förlopp.
- Säkerställa att rätt sida opereras genom sidomarkering enligt klinikens/sjukhusets rutiner.
- Bedöma om kontralateral testikelbiopsi behöver utföras (om operationen görs med anledning av testikelcancer).
- Efterhör om patienten önskar testikelprotes i de fall då det är möjligt att implantera vid operationen. Förklara risker med implantation av protes.
- Se till att testikelprotes av rätt storlek finns tillgänglig.
- Diskutera komplicerande faktorer såsom avvikande anatomi (t.ex. läge i ljumsken), kroppsbyggnad, förekomst av ljumskbråck, hydrocele, tidigare ljumskkirurgi eller ökad blödningsrisk.
- Gå igenom patientens läkemedel och bedöm om t.ex. antikoagulantia behöver sättas ut inför ingreppet.
- Ta ställning till antibiotikaprofylax.
- Kontrollera om patienten står på andra läkemedel som kan påverka ingreppet (t.ex. immunsuppression).
- Bedöma om trombosprofylax behöver ordinerats.
- Kontrollera att prover för analys av preoperativa tumörmarkörer har tagits.
- Kontrollera om spermieinsamling har skett

Operation

- Incheckning enligt WHO.
- Kontrollera/välj utrustning (rätt instrument, suturmateriel och bedövning skall vara framtagna).
- Adekvat positionerad patient och kontroll av sterilitet.
- Anlägga ilioinguinalblockad i relevanta fall.
- Lägga hudsnitt i korrekt ljumske med rätt läge.
- Debridering/operationsteknik.
- Öppna externusaponeurosen.
- Fria funikeln.
- Sätta peang/kärklämna på funikeln.
- Mobilisera och excidera testikeln inom tunica vaginalis.



-
- Dela och ligera av funikeln.
 - Lägga in och fixera testikelprotes i förekommande fall.
 - Sluta externusaponeurosen.
 - Adaption/suturering.
 - Ta kontralateral testikelbiopsi i förekommande fall.
 - Ändamålsenlig bandagering.
 - Kommunicera effektivt under operationen.
 - Hantera instrument och annan utrustning korrekt.
 - Välja adekvata instrument och suturmaterial.
 - Se till att preparatet blir korrekt omhändertaget.
 - Arbeta sterilt.
 - Varsam hantering av vävnad.
 - Identifiera när något avviker från det normala.
 - Be om hjälp när operationen inte går som förväntat.
 - Utcheckning enligt WHO.

Postoperativt

- Adekvat dokumentation i journal.
- Adekvat patologremiss.
- Informera patienten och ge adekvata råd om postoperativt förlopp.
- Återinsätta eventuella utsatta läkemedel.
- Bedöma när utskrivning är lämpligt.
- Bedöma och planera eventuellt återbesök till urologen eller onkologen.
- Sjukskrivning i de fall det behövs.

Fastställd:

Reviderad:

Upphävd: