



EPA-instruktion: Vasektomi

Denna instruktion är till för att underlätta bedömningen av ST-läkaren när hen utför en vasektomi. Varje moment behöver utföras med hänsyn till god hygien och ST-läkaren skall kunna redogöra för sina val av teknik, materiel och bedövning.

Om ingreppet utförs på en vaken patient bör särskild vikt läggas vid god kommunikation och respekt för patientens integritet.

Preoperativt

- Informera patienten. Uppta relevant anamnes eller se till att den finns dokumenterad i journalen. Förklara ingreppets genomförande, risker, komplikationer och förväntat postoperativt förlopp.
- Kontrollera att 5 § steriliseringslagen är uppfylld.
- Diskutera komplicerande faktorer såsom avvikande anatomi eller tidigare operation i området.
- Gå igenom patientens läkemedel och bedöm om t.ex. antikoagulantia behöver sättas ut inför ingreppet.
- Ta ställning till antibiotikaproylax.
- Bedöm om tromboprofylax behöver ordineras.
- Kontrollera om patienten står på andra läkemedel som kan påverka ingreppet (t.ex. immunsuppression).

Operation

- Incheckning enligt WHO i relevanta fall.
- Rätt instrument och annan utrustning framtagen, visa adekvat kunskap om utrustningen.
- Kontroll av korrekt tvätt och drapering.
- Lokalisera vas deferens.
- Adekvat applicerad lokalanestesi.
- Adekvat hudöppning, debridering, fånga vas deferens, lämplig delning/resektion av vas, blodstillning och hudförslutning.
- Kommunicera effektivt under operationen.
- Hantera instrumenten och annan utrustning korrekt.
- Välja adekvata instrument.
- Arbeta sterilt.
- Varsam hantering av vävnad.
- Identifiera när något avviker från det normala.
- Be om hjälp när operationen inte går som förväntat.
- Utcheckning enligt WHO i relevanta fall.



Svensk
Urologisk
Förening

EPA-INSTRUKTION
VASEKTOMI
2024-06-24

Postoperativt

- Adekvat dokumentation i journal.
- Remiss spermaanalys.
- Överväg att skicka exciderad rest av vas för PAD.
- Informera patienten och ge adekvata råd om postoperativt förlopp.
- Återinsätta eventuella utsatta läkemedel.
- Bedöma när utskrivning är lämpligt.
- Sjukskrivning i de fall det behövs.
- Planera uppföljning.

Fastställd:

Reviderad:

Upphävd: